LÚPULO

Ludmilla Antoniazzi

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LÚPULO 2018

3.4 World Hop Production 2018

	Acreage (ha)			Yields (to)			Alpha Acid (to)**		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
USA	21.433	22.533	23.379	40.206	48.190	48.584	4.005	5.192	5.223
Germany	18.598	19.543	20.144	42.766	41.556	41.797	4.775	4.265	3.920
Czech Republic	4.775	4.945	5.020	7.712	6.797	5.126	341	270	170
China*	(2.500)	(2.700)	(2.700)	(6.000)	(7.000)	(7.000)	(500)	(600)	(600)
Poland	1.475	1.576	1.614	3.044	2.993	2.800	262	248	200
Slovenia	1.484	1.590	1.667	2.476	2.767	3.100	135	150	175
Total	55.500	58.800	60.500	109.000	119.000	118.000	10.700	11.500	11.300

(*) estimates; no reliable data available

(**) time of harvest

International Hop Growers' Convention

IHGC - Economic Commission Summary Reports

Žalec, Slovenia - July 30, 2019

Country	Hop Acreage 2018 (Hectares, Ha)					Hop Production 2018 (in MT = 1.000 kg)				Alpha acid Prod. MT	Hop Acreage 2019 (Hectares, Ha) estimations					Hop Production 2019 (in MT = 1.000 kg) estimations				Alpha acid Prod. MT
	Aroma	Alpha	Hop area ¹	New	Total	Aroma	Alpha	Total	MT		Aroma	Alpha	Hop area ¹	New	Total	Aroma	Alpha	Total	MT	
Argentina	100	60	160	0	160	180	100	280	25	100	60	160	0	160	110	50	160	10		
Australia	454	177	631	21	652	1 159	423	1 582	225	476	176	652	48	700	1 385	260	1 645	217		
Austria	192	58	250	7	250	380	70	450	30	194	58	253	3	253	360	95	455	36		
Belgium	126	54	180	0	180	163	119	282	18	124	58	182	0	182	180	138	318	19		
Canada*	219	200	419	0	419	329	300	629	63	219	200	419	0	419	329	300	629	63		
China*	400	2 283	2 683	0	2 683	544	6 500	7 044	600	400	2 283	2 683	0	2 683	544	6 500	7 044	600		
Czech Republic	4 679	45	4 724	296	5 020	5 025	101	5 126	185	4 714	49	4 763	241	5 004	6 180	120	6 300	280		
France	474	39	463	33	496	775	89	864	25	440	26	466	41	506	807	70	877	36		
Germany	10 822	8 465	19 287	857	20 144	20 054	21 740	41 794	4 000	10 860	8 913	19 773	644	20 417	20 900	22 800	43 700	5 000		
Japan	53	53	106	0	106	82	120	202	25	53	53	106	0	106	82	120	202	25		
New Zealand	360	52	412	0	412	679	115	794	70	598	145	743	331	743	780	239	1 019	100		
Poland	635	946	1 581	81	1 662	1 125	2 083	3 208	280	646	1 016	1 662	20	1 682	1 000	1 900	2 900	244		
Romania	73	197	270	7	277	85	130	215	19	75	202	277	3	280	90	165	255	29		
Russia	162	66	228	24	252	192	138	330	18	168	74	242	12	254	200	150	350	20		
Serbia	0	0	8	0	8	0	0	16	2	0	0	8	0	8	0	0	16	2		
Slovakia	137	0	137	0	137	127	0	127	5	129	0	129	4	133	105	0	105	4		
Slovenia	1 526	21	1 547	120	1 667	3 018	60	3 078	160	1 500	21	1 521	75	1 596	2 440	60	2 500	130		
South Africa*	73	354	427	0	427	77	677	754	75	73	354	427	0	427	77	677	754	75		
Spain	0	536	536	0	536	0	900	900	109	0	532	532	0	532	0	900	900	109		
Ukraine*	309	60	369	0	369	400	80	480	30	309	60	369	0	369	400	80	480	30		
UK-England	948	0	948	0	948	1 377	0	1 377	92	953	0	953	0	953	1 430	0	1 430	95		
USA	17 423	5 956	23 379	846	23 379	33 272	15 901	49 173	5 594	18 489	5 674	24 163	0	24 163	33 280	15 750	49 030	5 600		
IHGC	39 115	19 622	58 745	2 292	60 184	69 043	49 646	118 705	11 650	40 520	19 954	60 483	1 422	61 570	70 679	50 374	121 069	12 724		

* Since no country updates were available, figures from Freising in 2019 were used.

¹ Acreage without new hop areas

Difference Σ 2019-2018	1 405	332	1 738	-870	1 386	1 636	728	2 364	1 074
Difference Σ 2019-2014	13 130	2 341	15 480	-2 215	14 600	20 671	5 890	25 376	3 327
Difference Σ 2018-2009	14 815	-8 493	6 332	-3 717	7 419	29 277	-20 371	8 922	2 082

Factores que Influyen y Correlaciones

ZONAS DE CULTIVO:

Europa Central

USA

China

Condiciones de luz y duración del día!

África do Sul

Nova Zelândia

Austrália

Patagônia

REGIONES PRINCIPALES:

Washington – Yakima Valley;
 Oregon – Willamette Valley;
 Idaho – Treasure Valley.

EL LÚPULO

RAZONES PARA EL USO DEL LÚPULO:

- Confiere amargura (fracción no volátil);
- Contribuye al aroma (fracción volátil);
- Contribuye con la coagulación de proteínas;
- Las sustancias amargas contribuyen positivamente con la espuma;
- Acción bacteriostática;
- Contrasta con la dulzura de la malta y crea un equilibrio.

PRODUCTOS COMERCIALES DE LÚPULOS

- Lúpulo en flor;
- Lúpulo en pellets (grado 90);
- Lúpulo concentrado, pellets (grados 75 y 45);
- Extractos de lúpulo;
- Extractos de lúpulo isomerizados;
- Lupulina concentrada;
- Aceites de lúpulo;
- Extractos estables a la luz.

- **Problemas con el lúpulo en flor**

- Logística;
- Heterogeneidad;
- Estabilidad;
- Dosis Automática;
- Rendimiento;
- Clarificación del mosto;

Lupulina

Contiene resinas y aceites

- El proceso de prensado ocurre bajo **presión**, las glándulas de lupulina **se rompen**.
- Facilita la transferencia de compuestos de lúpulo para el mosto o cerveza.
- Envasado con gases inertes debido a la ruptura de la membrana de lupulina, susceptible a la oxidación.

RB 60

Pelels

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO:

- Sufre alteración debido a la oxidación y al envejecimiento;
- Almacenamiento en cámaras frías y oscuras.

Temperaturas de almacenamiento de lúpulo y sus productos

Tiempo de almacenamiento

	1 ano	3 anos	5 anos
Lúpulo em Flor	0 °C	- 20 °C	Inviabile
Pellets	10 to 15 °C	5 °C	0 °C
Extratos	< 20 °C	10 °C	5 °C

Lúpulo - Composição

Lúpulo - Composición

Componente	% del compuesto
Percentual de agua	8-12%
Resinas Totales (blandas y duras)	10-25%
Aceites de lúpulo	0.5-3%
Polifenoles	4-14%
Proteínas	12-22%
Carbohidratos	2-4%
Celulosa	40-50%

- Estos valores varían de la siguiente manera:
 - Variedad;
 - Región de cultivo;
 - Tiempo de cosecha;
 - Intensidad de secado.

Lúpulo - Composición

- **El lúpulo contiene tres grupos de sustancias con una composición muy específica:**
 - Sustancias amargas (que se encuentran solo en el lúpulo);
 - Compuestos aromáticos;
 - Polifenoles.

Lúpulo – Compuestos Amargos

RESINAS BLANDAS

α -acids

Cohumulone R = -CH(CH₃)₂

n-Humulone R = -CH₂CH(CH₃)₂

Adhumulone R = -CH(CH₃)CH₂CH₃

β -acids

Colupulone

n-Lupulone

Adlupulone

Las sustancias amargas también tienen **acción bacteriostática** y contribuyen con la **calidad de la espuma**.

Lúpulo - Sustancias amargas

RESINAS BLANDAS

➤ α-ácidos do lúpulo

Humulona
35-70%

Cohumulona
20-65%

Adhumulona
10-15%

Prehumulona
1-10%

Posthumulona
1-3%

Lúpulo - Sustancias amargas

RESINAS BLANDAS

➤ β-ácidos do lúpulo

Lupulona
30-55%

Colupulona
20-55%

Adlupulona
10-15%

Prelupulona
1-3%

Postlupulona
?%

Lúpulo - Sustancias amargas

RESINAS BLANDAS

Isomerización

alpha-acid

Baja solubilidad
Amargura menor

Cocción del mosto

iso-alpha-acid

Soluble en agua
Bastante amargo

AMARGOR

- En el cálculo del amargor se entiende que 1 mg / L de ácido iso-alfa = 1 IBU;
- Sin embargo, este cálculo no tiene en cuenta otros componentes de amargor que son aún más relevantes en Dry Hopping;

AMARGOR – CÁLCULO DEL AMARGOR

- Cerveza Pilsen 30 IBU
- 1000 litros del mosto
- Magnum 12% α -ácido
- 60 min – 30% rendimiento

Tasa de contracción del mosto

$$\text{Mosto frío} = 1000 \times 0,96 = 960 \text{ litros}$$

30 IBU = 30 mg/l Compuestos amargos deseados

$$30 \text{ mg/l} \times 960 \text{ litros} = 28.800 \text{ mg} = \underline{28,8 \text{ g}}$$

$$\frac{28,8 \text{ g} \times 100}{30} = 96 \text{ g}$$

Rendimiento

$$\frac{96 \text{ g} \times 100}{12} = \underline{800 \text{ gramos de lúpulo}}$$

% de α -ácido de lúpulo

AMARGOR - MEDICIONES

- BU o IBU – Es la medición espectrofotométrica de todos los compuestos amargos

≠

- Iso-alfa-ácido – Medición por HPLC

Lúpulo - Complejidad del amargor en la cerveza

Componentes principales:

α -ácidos $\rightarrow$ iso- α -ácidos;

- No-iso- α -ácido (nIAS) o sustancias amargas acompañantes, ex. α -ácidos no isomerizados;

Derivados de α -ácido, todavía presentes en el lúpulo

Derivados de α - e iso- α -ácidos, formados durante la cocción;

β -ácidos;

Derivados de β -ácidos;

Resinas blandas no caracterizadas;

- Sustancias Polifenólicas de Amargor;

Relación IBU : Iso- α -ácidos (IA)

Producto	IBU : (IA)
Iso-extract	< 1.0
CO ₂ -extract from high- α -hops	~ 1.0
Pellets from high- α -hops	1.03 – 1.05
Pellets from aroma hops	1.15 - 1.50
Pellets from noble aroma hops	1.25 – 2.0
Dry hopping with Pellets	up to 5

IBU:iso- α -ácidos en la cerveza $\rightarrow$ F(β : α en el lúpulo)

Armonía de amargor según la relación IBU : Iso- α -ácido

Calidad del Amargor → F(β : α en Lúpulo)

Dosaje de nIAS

- Lúpulos con relación β/α razonable ($> 1,0$);
- Principalmente variedades aromáticas;
- La adición tardía de lúpulo aumenta nIAS.

AMARGOR – SUSTANCIAS ACOMPAÑANTES

RE-Bottle Carbonation?

pH-Flavor Stability?

Bitterness?

*pH and RE measured using Anton Paar AlcoLyzer

*BU measured using ASBC MOA Beer-23

AMARGOR – PH

AMARGOR – SUSTANCIAS ACOMPAÑANTES

EXTREME DRY HOPPING WITH CASCADE HOP PELLETS

AMARGOR – POLIFENOLES

- Prejuicio:
 - "Los PP son responsables por el amargor tánico"
- >50 años:
 - Los lúpulos almacenados con aire resultaron en PP oxidados y polimerizados
 - Mayor tiempo de cocción (> 120 min.) En contacto con oxígeno
 - Hoy:
 - Los lúpulos se almacenan fríos
 - El lúpulo y los pellets se embalan inertes
 - Cocción de 60 min sin oxidación
 - Los PP del lúpulo son dosificados frescos en la cerveza

Efecto de los Polifenoles del Lúpulo

Condición: “fresco”, no oxidado!

- Mejora el cuerpo de la cerveza;
- “Sustancias Polifenólicas de Amargor” cómo prenylflavonoides, flavonoides producen un amargor ligero y agradable;
- Mejora la estabilidad de la cerveza;
- Algunas proanthocyanidinas (principalmente malta y menos lúpulo) aumentan la turbidez;

Lúpulos Aromáticos son más ricos en Polifenoles

Lúpulo – Calidad de Amargura

**** significant**

AROMA

AROMA - AROMAS LÚPULO X AROMAS CERVEZA

- El aroma del Lúpulo en flor no tiene una correlación 100% directa con los aromas producidos en la cerveza

Efectos Sinérgicos – Dry Hopping

Efectos Sinérgicos – Dry Hopping

AROMA

Son 6 variables que influyen directamente con el Dry Hopping

- Cantidad
- Tiempo
- Temperatura
- Contacto
- Cantidad de Adiciones
- Contacto con la Levadura

AROMA - CANTIDAD

- 3 a 8 g por L de Cerveza;
- Cuando 8 g/L son utilizados, se recomienda múltiples dosis durante un período de 4 semanas;
- Uso de Pellets: solubilización más rápida de los aceites;
- Lúpulo en Flor solubilización más lenta y aromas más sutiles;

No existe una fórmula específica y las otras variables deben tenerse en cuenta.

AROMA - CANTIDAD

transfer rate [%]	mg/g hop pellet	2 g pellet/ 5 % ethanol	2 g pellet/ 10 % ethanol	4 g pellet/ 5 % ethanol
Myrcen	3.5	0.3 – 2.0	0.4 – 1.3	0.3 – 1.6
β -Caryophyllen	1.0	0.3 – 2.6	0.5 – 0.9	0.1 – 1.1
α -Humulene	3.4	0.3 – 2.6	0.4 – 1.0	0.1 – 1.1
Geraniol	0.02	72 - 86	64 – 86	49 – 68
Linalool	0.07	83 – 95	78 - 96	63 - 83

Transfer rates by dry hopping in model solutions (Krottenthaler, EBC 2011)

AROMA - CANTIDAD

Hop dosage rate – Overall Hop Aroma Intensity

AROMA - CANTIDAD

Hop dose response – hoppy quality (citrus and herbal/tea)

AROMA - CANTIDAD

Hop Compound Concentrations – Terpene Alcohols

^aKishimoto J. Agric. Food Chem Vol 54, no 23. 2006

*Average of 4 SPME-GC/MS instrumental runs

#Estimated values lower than LOQ

AROMA - CANTIDAD

Hop Compound % Extraction – Terpene Alcohols

*Assuming 100% extraction based on hop oil hydrodistillation

Scott Lafontaine – Oregon State University - Dry Hopping Beer and Achieving Consistent Flavor – CBC2018

AROMA - TIEMPO

- Nuevamente, no hay una regla general. Es necesario hacer pruebas. Ex:
 - Russian River IPA – 7 días;
 - Blind Pig IPA – 10 días;
 - Pliny the Elder – 12 a 14 días;
 - Pliny the Younger – 4 semanas;
- Pellets o en Flor?
- Temperatura?
- Siempre mantener una “capa” de CO₂ en el tanque;

AROMA – TIEMPO (DRY HOPPING A 4°C)

Fig. 6: Increase of Linalool during Cold Hopping; Comparison between Leaf and Pellets

AROMA – TIEMPO

Figure 11. Extraction of Linalool during a 12 day dry hop treatment.

AROMA – TIEMPO

Figure 10. Extraction of Myrcene during a 12 day dry hop treatment.

AROMA - TEMPERATURA

- ¿Qué hacen las cervecerías en los Estados Unidos y Alemania?
- Más de 30% -> 0-5°C
- 26% -> 6-15°C
- 20% -> 16 - 25°C

AROMA - TEMPERATURA

Geraniol 1000 g/hl dy

Linalool 1000 g/hl dy

Geraniol 1000 g/hl st

Linalool 1000 g/hl st

AROMA - TEMPERATURA

Myrcene 1000 g/hl dy P90

Myrcene 1000 g/hl st P90

AROMA - CONTACTO

- Mezclar nuevamente el Dry Hopping en el tanque:
 - Cervecería – Con inyección de CO₂ por el fondo del tanque;
 - Hacer 5 días antes de transferir la cerveza o retirar el lúpulo;
- Hopbag / Lúpulo suelto.
- Flor/pellets

AROMA - CONTACTO

Hop Preparation and Dry-Hopping Parameters

- Blend brewer's cuts of whole cone hops by grinding

AROMA - CONTACTO

Pellet Typ 90

Abb. 5 Übersicht der Aromastoffzusammensetzung bei 1000 g/hl mit Pellet Typ 90 in einem dynamischen und statischen System

Pellet Typ 45

Abb. 6 Übersicht der Aromastoffzusammensetzung bei 1000 g/hl mit Pellet Typ 45 in einem dynamischen und statischen System

AROMA – CONTACTO CON LA LEVADURA

- Cuanto más levadura puedas eliminar, más aroma tendrá en la cerveza;
- Transfiera la cerveza del tanque de fermentación a un tanque de maduración;
- La extracción de aceites es mayor debido a la mayor superficie de contacto con la cerveza.

AROMA – CONTACTO CON LA LEVADURA

- Biotransformación de alcoholes monoterpenos

Diacetilo

AROMA – CONTACTO CON LA LEVADURA

- Formación de Diacetilo

AROMA – CONTACTO CON LA LEVADURA

- Formación del Diacetilo

AROMA – CONTACTO CON LA LEVADURA

- Enzimas del lúpulo

Enzyme	Hops	Malt (130 dp)
α -amylase	0.35	198
β -amylase	0.41	13
Amyloglucosidase	0.02	NA
Limit dextrinase	<0.01	NA

AROMA – CONTACTO COM LA LEVADURA

- Enzimas del lúpulo

Typical fermentation, no dry-hopping

AROMA – CONTACTO CON LA LEVADURA

- Enzimas del lúpulo

AROMA – CONTACTO CON LA LEVADURA

- Enzimas del lúpulo

Hop enzymes stimulate “after-fermentation”
AKA – Hop Creep

**No hay una regla general!
Hay que hacer experimentos!**

!!!MUCHAS GRACIAS!!!

**Contacto:
ludmilla@agraria.com.br**